



**Dépistage de la COVID-19 par le test Abbott Panbio<sup>MC</sup> : Clé de réponse du questionnaire d'évaluation**

	<b>Affirmations</b>	<b>Vrai/Faux</b>
<b>1</b>	Le test de détection antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag peut geler à une reprise.	F
<b>2</b>	Les échantillons prélevés doivent être analysés immédiatement.	V
<b>3</b>	Le prélèvement consiste à faire tourbillonner la pointe de l'écouvillon dans le tampon à l'intérieur du tube d'extraction en poussant dans la paroi du tube d'extraction au moins 3 fois.	F
<b>4</b>	Deux gouttes d'échantillon doivent être déposées dans le puits d'échantillon de la cartouche du test.	F
<b>5</b>	Tous les types d'écouvillons (salivaire, nasal, nasopharyngé) sont compatibles avec le test de détection antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag.	F
<b>6</b>	La lecture d'un résultat avant un délai de 15 minutes ou après 20 minutes est susceptible de générer un résultat erroné.	V
<b>7</b>	L'image ci-dessous indique un résultat <u>négatif</u> .	V
<b>8</b>	L'image ci-dessous indique un résultat <u>positif</u> .	F
<b>9</b>	Lorsqu'il y a résultat positif, la personne responsable du dépistage doit mentionner à la personne testée d'autodéclarer son résultat positif en appelant Protégeons les TNO et de s'isoler immédiatement.	V
<b>10</b>	Un résultat négatif sera simplement consigné comme tel, sans qu'aucun suivi ne soit nécessaire.	V